

لیسه میوه



کنترل شیمیایی:

۱. مالاتیون ۲ در هزار
۲. گوزاتیون ۲ در هزار

زمان مبارزه:

پس از متورم شدن جوانه ها و درست قبل از باز شدن

گلها



کرم سفید ریشه



کنترل زراعی:

- ۱- جمع آوری حشرات کامل از اواخر بهار به بعد
- الف- جمع آوری حشرات در صبح زود بوسیله تکاندن درختان
- ب- جمع آوری حشرات کامل با کمک نور چراغ
- ۲- از بین بردن علفهای هرز سطح باغ از علفهای هرز یکساله و چند ساله چون منبع غذایی خوبی برای لاروهای سن اول است.
- ۳- شخم زمستان و جمع آوری لاروها در اسفندماه

کنترل شیمیایی:

۳۰ روز پس از ظهور اولین سوسکها، تا عمق ۱۵ سانتی متری خاک سایه انداز درخت را بر می گردانیم و با سموم زیر مخلوط می کنیم: دیازینون با دوز یک ونیم در هزار و سوبین به صورت پودر، لیندین ۱۰ کیلو در هکتار به طریق محلول پاشی پای درخت در اوایل بهار و اوایل تابستان. بهتر است بعد از ریختن محلول پای درخت آبیاری سبکی نیز انجام شود.

شته



کنترل شیمیایی:

اگر شته ها موجب پیچیدگی برگ شوند یا تولید گال نمایند از سموم سیستمیک مانند **متاسیستوکس** استفاده می شود ولی اگر موجب پیچیدگی نشوند از **پرمیکارپ (پرمور)** که یک شته کش اختصاصی است استفاده می شود.



بیماری غربالی



کنترل شیمیایی:

قارچکش کاپتان برای مبارزه با بیماری غربالی بهترین است. کاپتان نه تنها در جلوگیری از بیماری مؤثر است بلکه برگ و مخصوصاً میوه های درختانی که با آن سمپاشی شده اند شفافیت و جلای خاصی پیدا می کند. بهترین نتیجه از سمپاشی موقعی حاصل می شود که درختان مبتلا ۱ مرتبه در اواخر زمستان قبل از بیدار شدن درختها و تورم جوانه ها با **محلول بردوی ۲ درصد و ۳ مرتبه در بهار با کاپتان ۳ در هزار** سمپاشی شود که اولین سمپاشی بهاره بلافاصله بعد از ریزش گلبرگها توصیه می گردد. سمپاشی با محلول بردو بهتر است ۲ مرتبه یکی در پائیز پس از ریزش برگها و دیگری در اسفند ماه قبل از بیدار شدن درختها صورت گیرد و بدین ترتیب می توان سمپاشی بهاره را تا حتی ۱ مرتبه هم تقلیل داد.

شانگر باکتریایی

(صمغ میکروبی یا کیتراگه)



کنترل زراعی:

۱. انتخاب پایه و پیوندک سالم و مقاوم
۲. تغذیه مناسب باغ
۳. کنترل دوره آبیاری
۴. دقت در انجام هرس تابستانه و پاییزه
۵. بیرون ماندن پیوندک درخت از خاک
۶. آبیاری صحیح بدون تماس آب با تنه درخت (آبیاری تشتکی)

کنترل شیمیایی: حذف محل‌های تجمع بیش از حد کتیرا از درخت و سپس استفاده از محلول بردو ۱-۲ درصد و اکسی کلورومس ۳/۵ در هزار در پاییز و در بهار قبل از شکوفه دهی

آفات و بیماریهای مهم زردآلو



مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ماهنشان

شرکت خدمات توسعه کشاورزی

سبز اندیش ماهنشان